Black Prince

Vass7R05s391-395

Physical Report of the Collection Vassal-Montpellier

OMto 128

Taust #V.FH
7-R5 & 391.395

dagadantadagadadaga







NOM Black Prince N EMPLACEMENT 7 B50391. 395 ANNEE 1989

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	и и 3	20,3 20,3 20,3 20,3	23 3 . 23 3 . 23 3 .	2 0 0	2,8	31,5	5.97	12.6	7,8	11,8	21,8	AR .9 +5
Pou	ırritu:	re: 0	.3.89	Mill.	: <i>O</i>	Port :	Nui'	enge	,	/igueu	r : !	3

ANNEE /990 NOM Black Prince

EMPLACEMENT 7 R 50 - 3 91 (3 9 5 . .

ni

Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison												2
Souche	yeux	début	mi/déb	grap	lité	début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	Maturité
5	15 <u>D</u> 1	12.3	15.3. 15.3. 12.3. 12.3.	6 (+3)								23-9.30
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: Lewye Vigueur:												

		1991 ack Br	vice		EMPLACE	MENT	7 Rg 5								
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo: début	raison mi/f	fin		raison mi/v	fin	Maturité			
F 0: 0) 4	5	13,3	18.3.	0	Grappe Pour :	: 6	Mil	Dim 1 : O	: 13	Compa	cité	23, 9 +6 : L -(11-)C			
)	le 18.3	.91		disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: E-Gr-Rs-Rg-N										
,			*			41				,					

danimhatadantadantal

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement:

Black Prince 7 R 5 A . 391-395 (6.2)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 160 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 169 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etales - en goutfière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 200 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 260 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Mervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - dureteux 219 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbo: glabro 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 261 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronsées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A péticle glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 239 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 266 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo88

Black Frince 7R5A-391.3956.1) N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

daarmhadaalaatadaataal

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

Noeuds

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue. colore 264 vert 265)

Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Black Prince 7 R5 s. 391-3957s.2)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 /- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147) - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/12 - sans villosité

laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154/- cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 1790 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiel ement - totalement.

Calvo 88

dantadantadantadatad

N° d'ordre :

Désignation :

FR5 2.391-395 (6.1)

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 45 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 / aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 -

de taille régulière - irrégulière (dimensions :25 x 23).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97/- ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121).

A pédicelle de couleur : verte 122) - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 1/27,

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen (31) - long (32)

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134).

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

. Calvo 88

diminulmituulmituulustiisi.

Black Prince 7 R50-391-395 s.1

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violace (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2). saillant (1) = effacé(2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo88

N° d'ordre:
Désignation: Black Pruice
Emplacement: 7 R5 1 391. 395.

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7-8-9 L_1/L_2 : (10)-(11) L2/L : 12 - 13 - (14) - (15) - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270) : 271 Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43) - 44 Dents (angle) : 45 - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58-: (60) - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - (65) - (66) - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 90